

ContexGel-Návlek

2S10, 2S11, 2S20, 2S21, 4S10, 4S11, 4S20, 4S21

Doporučení pro pacienta

Narolování ContexGel návleku

Upozornění:

Nenanášejte krémy, klouzek, vazelínu či jiné prostředky na pahýl nebo ContexGel návlek, mohli byste jej poškodit. Pahýl musí být čistý, suchý a bez zbytků mýdla. Doporučujeme používat 10H2 (Přípravek k mytí pahýlu), 10H3 (Ochranný krém na kůži), 10H4 (Regenerační krém zvlhčovací).

1. Otočte srolovaný ContexGel návlek, tak aby gelová strana byla vnější stranou.
2. Otočte ContexGel návlek tak, aby logo a sériové číslo bylo vpředu. Položte konec ContexGel návleku na konec pahýlu. Jestliže použijete ContexGel návlek se zámkem, musí být zámkové připojení na konci pahýlu vycentrováno.
3. Narolujte ContexGel návlek opatrně gelovou stranou dovnitř na pahýl. Pro dosažení optimálního komfortu nošení je nutné, aby stehy nepřiléhaly na citlivá nebo kostnatá místa.

Upozornění:

Dbejte na to, aby ContexGel návlek byl rolován a ne tažen. Při natažení ContexGel návleku se natáhne i pokožka, což vede nepohodlnému natvarování.

4. Zabraňte vzniku vrásek a uzavření vzduchu mezi pahýlem a návlekiem.
5. Pokud je mezi ContexGel návlekiem ještě místo, měli by jste použit silnější návlek nebo pahýlovou punčošku.
6. Nyní nasad'te protézové lůžko. Použijete-li návlek se zámkovým připojením, dbejte patřičných doporučení k používanému zámku.

Potivost

Během prvních týdnů používání ContexGel návleku může docházet ke zvýšené potivosti pahýlu. Někteří protetičtí technici zjistili, že pahýly ošetřené bezparfémovými antirespiranty, které byly nanášeny před narolováním ContexGel návleku jsou účinné prostředky snižující potivost. Dbejte však vždy pokynů v návodu pro tyto produkty a nikdy je nepoužívejte při otevřených ranách na pahýlu.

Čištění ContexGel návleku

Upozornění:

Při používání ContexGel návleků je dodržování hygienických pravidel velmi důležité. ContexGel návlek musí být každý večer důkladně vyčištěn a dobře vysušen.

Denní čištění

1. Srolujte ContexGel návlek z pahýlu tak, aby byl otočen naruby = gelovou stranou ven.
2. Vyčistěte ContexGel návlek ihned po srolování z pahýlu teplou vodou s PH neutrálním. Doporučujeme použít přípravek k mytí pahýlu 10H2. Mýdlo naneste rukou nebo měkkým hadříkem.

Upozornění:

Neošetřujte kartáčem či jiným hrubým předmětem, mohlo by dojít ke zdrsnění plochy a k následnému vyvolání nežádoucí kožní reakce. Nepoužívejte roztoky chloru (bělidla), které mohou poškodit látkový potah ContexGel návleku.

3. Dbejte na dokonalé vypláchnutí zbytků mýdla z ContexGel návleku.
4. Srolujte návlek na rub = gelovou stranou ven a nechte vyschnout na stojanu
5. Očistěte a ošetřete Váš pahýl PH neutrálním mýdlem a ochranným a regeneračním krémem 10H2, 10H3, 10H4

Týdenní čištění

1. Naneste malé množství ethyl nebo isopropyl-alkoholu na měkký a čistý hadřík (Sprej pro lepší rolování 10H5).
2. Otřete gelovou stranu tímto prostředkem.
3. ContexGel návlek uložte k vyschnutí na stojan.

Upozornění:

Nenamáčejte, nebo nenechávejte na ContexGel návlek působit delší dobu ethyl nebo isopryl-alkohol, mohlo by dojít ke ztvrdnutí a tím k jeho poškození.

Uchovávání ContexGel návleku

Pokud ContexGel návlek nepoužíváte, uchovávejte jej na dodávaném stojanu. Nebudete-li návlek používat delší dobu, zabalte jej navíc do čistého igelitového sáčku.

Případné další informace Vám poskytne Vaše protetické pracoviště.

Výrobce:

Streifeneder ortho.production GmbH

Prodejce:

ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.

Husova 54

538 54 Luže

Tel. 469 671 430

Fax. 469 671 070

Mob. 604 669 098

e-mail: ortho-aktiv@quick.cz

www.protetika-ortho-aktiv.cz